FICHA TECNICA

MAGELLAN CLOUD

Endectocida de acción prolongada para parásitos internos y externos en bovinos

Solución Inyectable

Uso Veterinario

Cada 100mL contiene:

Composición	Contenido
Ivermectina	3.15 g
Excipientes c.s.p	100 mL

DESCRIPCION

MAGELLAN CLOUD es una solución estéril que contiene Ivermectina al 3.15% para ser administrado solo por vía subcutánea, con acción endectoparasiticida.

INDICACIONES

En bovinos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi, Haemonchus placei, Trychostrongylus axei, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia sp., Cooperia surnabada, Haemonchus sp., Oesophagostomum radiatum.* Parásito pulomonar: *Dyctiocaulus viviparus* (adultos y L4). Parásitos externos: Nuche: ayuda en el control de *Dermatobia hominis* (fase parasitaria). Piojos: *Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus.* Ayuda en el control de *Damalinia bovis*. Ácaros de la sarna: *Psoroptes comunis var. Bovis*, *Sarcoptes scabiei var. Bovis* y *Chorioptes bovis.* Miasis causada por *Cochliomya hominivorax*, Garrapatas: ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) mircroplus*. Coadyuva en el control de la reinfestación causada por: *Trichostrongylus axei, Cooperia sp.* por 42 dias. *Ostertagia ostertagi* y *Oesphagostomum radiatum* por 49 días, *Dyctiocaulus viviparus* por 63 dias, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* por 75 días, *Psoroptes comunis var. bovis* por 56 días y *dermatobia hominis* por 140 días.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACION

Inyectar únicamente por vía subcutánea 630 mcg por Kg. de peso vivo empleando aguja de 15 a 20 mm, calibre 16. En la práctica aplicar 1mL por cada 50 Kg. de peso vivo. Para la aplicación manejar equipo estéril y procedimientos asépticos.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Tabla de dosificación	
Peso (Kg)	**mL**
100	2
150	3
200	4
250	5
300	6
350	7
400	8

TIEMPO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar en vacas en producción de leche para consumo humano ni dentro de los 122 días anteriores al parto.

PRECAUCIONES

1. No debe aplicarse a animales enfermos, convalecientes, flacos o sometidos a condiciones de estrés, ni a animales menores de 4 meses.
2. No aplicar por vía intravenosa (IV) ni intramuscular (IM).

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura entre 15°C-25°C, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 20mL, 50mL, 200mL, 500mL y 1000mL

Marca registrada de **BOGAL VET S.A.S**

USO VETERINARIO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VENTA BAJO FORMULA DEL MEDICO VETERINARIO

ELABORADO POR: AETHER CENTRE (BEIJING) BIOLOGY CO., LTD.

PARA: BOGAL VET S.A.S

IMPORTADO POR: BOGAL VET S.A.S

REGISTRO ICA No. 9757-MV