DHARP®

MULTIPEN®

Triple penicilina L.A.

POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR
ANTIBIÓTICO INYECTABLE

PARA USO VETERINARIO

7,5 M U.I.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Una vez reconstituido el producto cada ml contiene:

Penicilina G Benzatinica 125.000 U.I.

Penicilina G Sódica 93.750 U.I.

Penicilina G Procainica 93.750 U.I.

Excipientes c.s.p 1.0 ml

INDICACIONES: En bovinos, equinos, ovinos y porcinos para el tratamiento de infecciones producidas por *Streptococcus agalactiae, Corynebacterium pyogenes, Streptococcus uberis, Corynebacterium equi, Streptococcus dysgalactiae, Bacillus anthracis, Fusobacterium necrophorum, Streptococcus pyogenes,Streptococcus sp, Staphylococcus aureus, Clostridium septicum, Clostridium chauvoei, Clostridium perfringens, Clostridium novyi, Clostridium haemolyticum, Clostridium tetani, Leptospira sp, Listeria monocytogenes,Corynebacterium renale, Erysipelothrix insidiosa, Actinomyces bovis.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda exclusivamente.

DOSIS: Cuando se suspende en 20 mL de diluyente adjunto, se alcanza un volumen de 24 mL, por tanto cada mL de la suspensión reconstituida contiene 93.750 U.I. de Penicilina G Sódica, 93.750 U.I. de Penicilina G Procainica y 125.000 U.I. de Penicilina G Benzatinica, para un total equivalente a 312.500 U.I. por ml.

La dosificación en bovinos, equinos, ovinos y porcinos es de 10.000 a 20.000 UI por Kg de peso, en la práctica 1 ml por cada 15 Kg de peso.

Repetir la dosis a los 5 o 7 días, la frecuencia y duración del tratamiento puede variar según el criterio del médico veterinario.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MEDICO VETERINARIO

LEA EL INSERTO ADJUNTO

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSÉRVESE EN LUGAR FRESCO, SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO: El producto sin reconstituir debe conservarse en un ambiente fresco y seco. Una vez reconstituido se recomienda guardar el producto en refrigeración de 2 a 7 grados centígrados hasta por 5 días, para garantizar su estabilidad.

REG. ICA: 8805-MV

Elaborado por: LABORATORIOS PROQUIVET S.A.S.

Para: BOGAL VET S.A.S