XACTIVE
Modificador Orgánico

SOLUCION INYECTABLE
USO VETERINARIO

Composición
Cada 100 ml contienen

Ácido Oleico	750	mg
Cloruro de Magnesio Hexahidatado	210	mg
Cloruro de Sodio	50	mg
Cloruro de Zinc	10	mg
DL-Metionina	210	mg
Glicina	422	mg
Hipofosfito de Calcio	1000	mg
Ioduro de Potasio	15	mg
L-Arginina HCl	200	mg
L-Histidina HCl	210	mg
L-Leucina	210	mg
L-Lisina HCl	1000	mg
L-Triptofano	50	mg
L-Valina	200	mg
Monoglutamato de Sodio	210	mg
Nicotinamida	100	mg
Selenito de sodio	33	mg
Tiamina HCl.	50	mg
Vitamina B12	20	mg
vitamina D3 (Colecalciferol)	5	mg
Vitamina E	1000	UI
ATP	500	mg
Sulfato de Cobre	2	mg
Excipientes c.s.p	100	ml

.

Presentación comercial:

Frasco de plástico en polietileno de alta densidad por: 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, 20 ml.

Producto de **BOGAL VET S.A.S**

INDICACIONES

En bovinos, ovinos y caprinos, en el tratamiento de las deficiencias de vitaminas, electrolitos, minerales y aminoácidos presentes en la formula y como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario

Especies para las cuales es recomendado:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar vía intramuscular o subcutánea en la cara anterior o posterior de la paleta.

Bovinos: administrar 1 ml por cada 50 Kg de peso vivo.
Ovinos y caprinos: administrar 1 ml por cada 20 Kg de peso.

En bovinos de ceba aplicar cada 90 días. Se pueden efectuar tres aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario.

En animales convalecientes de enfermedades debilitantes aplicar 1 dosis cada tercer día, por 3 aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario.

En ovinos y caprinos aplicar cada 60 días. Se pueden efectuar tres aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario.

Consérvese a temperatura inferior a 30°c.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Venta bajo fórmula del médico veterinario.